

Waarom vaccineren tegen blauwtong bij runderen?

Momenteel zijn er drie vaccins tegen BTV-3 goedgekeurd. Voor alle vaccins is in het kader van de toelating aangetoond dat ze het aantal virusdeeltjes in het bloed verminderen, waardoor (ernstige) ziekteverschijnselen worden beperkt en sterfte in veel gevallen wordt voorkomen.

Hoewel niet alle ziekte en sterfte kan worden voorkomen, blijft vaccinatie de beste manier om dieren tegen het blauwtongvirus te beschermen.

Bij een hoge vaccinatiegraad zal de verspreiding van het virus afnemen. Door uw eigen dieren te vaccineren, levert u hier een bijdrage aan.

Runderen hebben twee dosis van het vaccin nodig. Het duurt na de tweede dosis nog vier weken voordat de dieren optimaal beschermd zijn.

Vragen over de kosten van het blauwtongvaccin? Bespreek dit met uw dierenarts.

Uitgevoerde prevalentie onderzoeken bij melkveebedrijven zeggen alleen iets over de lacterende koeien en niet over het overige vee op het bedrijf. Ook met een prevalentie van 50-75% kan de impact van een nieuwe besmetting groot zijn.

Door niet te vaccineren neemt u een financieel risico. Ondernemers die te maken krijgen met blauwtong op hun bedrijf, krijgen niet alleen te maken met emotionele, maar ook met financiële gevolgen. Bijvoorbeeld door een verlaagde melkproductie bij zieke melkkoeien of sterfte.

Het knuttenseizoen begint in april en loopt door tot november met een piek in augustus en september, het is zaak dat voor de piek dieren beschermd en dus gevaccineerd zijn.

De bijwerkingen, zoals gemeld in de bijsluiter van de vaccins, zijn mild en verdwijnen vanzelf na enkele dagen tot weken.

